

### **Anexo III**

#### **Formulario Terapéutico**

Las características que reúne éste formulario son las siguientes:

Los principios activos incluidos atienden el 95% de los problemas de salud que se presentan en la consulta ambulatoria.

No se incluyen los medicamentos financiados a través del Fondo Solidario de Redistribución por resoluciones de la Administración de Programas Especiales y leyes de protección de grupos vulnerables.

No se incluyen medicamentos de venta libre, ni específicos para patologías oncológicas.

La cobertura de los medicamentos específicos para la terapéutica de la Diabetes ( Resolución 301/99MsyAS) se especifica en el Anexo I, por lo que no está incluida en este formulario

La cobertura de los medicamentos específicos para la terapéutica de la Miastenia Gravis (Resolución 791/99MsyAS) se especifica en el Anexo I, por lo que no está incluida en este formulario.

Los medicamentos incluidos en el listado tienen cobertura obligatoria por los Agentes del Seguro de Salud al 40% del valor de referencia según Anexo IV de la presente Resolución

Los Agentes del Seguro de Salud podrán ampliar la cobertura e incluir otros medicamentos de acuerdo a las necesidades de sus beneficiarios y financiamiento.

Se incluyeron los principios activos que demostraron tener efectividad clínica comprobada, y ser la mejor alternativa en relación al resto de otros principios activos dentro de la banda terapéutica en las que fueron evaluados, los estudios disponibles de costo- efectividad correspondientes.

La selección de principios activos fue realizada sobre la base de los criterios que se establecen en las guías de Evaluación de Tecnología Sanitaria para la Medicina Basada en la Evidencia.

Por el avance constante de la investigación médica, se modificará este listado a través de la Comisión para la presentación del Programa Médico Obligatorio definitivo del Anexo II de la presente Resolución, acorde a lo que determina el Decreto 486/2002.

El listado se corresponde con la clasificación ATC (Anatómica-Terapéutica-Clínica) y su codificación.

## **A0 APARATO DIGESTIVO Y METABOLISMO**

### **A01 ESTOMATOLÓGICOS**

#### **A02A ANTIÁCIDOS**

A02AD Combinaciones de Al, Ca y Mg

#### **A02B ANTIULCEROSOS**

A02BA02 Ranitidina

A02BC Omeprazol

#### **A03A ANTIESPASMÓDICOS**

A03BB Metilbromuro de homatropina

#### **A03F PROCINÉTICOS**

A03FA Metoclopramida

#### **A07 ANTIDIARREICOS**

A07CA Sales para rehidratación oral

#### **A07D INHIBIDORES DE LA MOTILIDAD INTESTINAL**

A07DA03 Loperamida

#### **A07E ANTIINFLAMATORIOS INTESTINALES**

A07EC01 Sulfasalazina

A07EC02 Mesalazina

- Pacientes con colitis ulcerosa o enfermedad de Crohn y antecedentes de intolerancia probada a sulfasalazina.

### **A10 ANTIDIABÉTICOS**

#### **A10B ANTIDIABÉTICOS ORALES**

Cobertura de acuerdo a normativas de Programas Nacionales

A10BA02 Metformina

A10BB01 Glibenclamida

A10BB07 Glipizida

#### **A11 VITAMINAS**

A11CB Combinación de vitaminas A y D (o asociaciones conteniendo vitaminas A+D+C o A+D+C+flúor)

Sólo para Plan Materno Infantil en aquellos niños con deficiencias dietéticas.

A11CC04 Vitamina D3 - calcitriol-

Pacientes con insuficiencia renal crónica con osteodistrofia renal.

Pacientes con hipoparatiroidismo con hipocalcemia refractaria.

A11DA01 Vitamina B1 (tiamina) (o asociaciones fijas conteniendo vitamina B1 + B6)

Se asegura la cobertura sólo para preparados que contengan exclusivamente éstos principios activos, no otros preparados multivitamínicos.

A11DA03 Vitamina B6 (piridoxina) ( o asociaciones fijas conteniendo vitamina B1 + B6)

Se asegura la cobertura sólo para preparados que contengan exclusivamente éstos principios activos, no otros preparados multivitamínicos

## **B SANGRE Y HEMATOPOYESIS**

### **B01A ANTITROMBÓTICOS Y ANTIAGREGANTES**

B01AA03 Warfarina

B01AA07 Acenocumarol

B01AB01 Enoxaparina

- Profilaxis en pacientes con alto riesgo de trombosis venosa profunda:
- Cirugía ortopédica de cadera y rodilla, hasta 14 días luego de la cirugía
- Politraumatismos
- Tratamiento de pacientes con trombosis venosa profunda:

a) Tratamiento de la trombosis venosa profunda en domicilio, como alternativa a la internación.

b) Tratamiento de la Trombosis venosa profunda o TEP en la embarazada en el primer trimestre o luego de la semana 34

Dosis indicativa: enoxaparina: profilaxis: 20 a 40 mg /día; tratamiento: 1 mg Kg cada 12 hora;

B01AC05 Ticlopidina

- Antiagregante plaquetario en pacientes que tengan contraindicación documentada para recibir ácido acetilsalicílico, teniendo en cuenta que la aspirina es de indicación primaria antes de utilizar ésta droga.
- Antiagregante en el manejo de postangioplastia coronaria, hasta 1 mes posterior a la realización de la práctica.

B01AC04 Clopidogrel

- Antiagregante plaquetario en pacientes que deban recibir ticlopidina y tengan una contraindicación documentada a esta droga (neutropenia)

B01AC06 Ácido acetilsalicílico

- Antiagregante de elección, sólo se da cobertura a aquellas formas farmacéuticas de bajas dosis que son las que producen el efecto antiagregante y que a su vez no sean de venta libre.

### **B02B VITAMINAS K Y OTROS HEMOSTÁTICOS**

B02BA Vitamina K

## **B03 ANTIANÉMICOS**

### **B03A HIERRO**

B03AA07 Sulfato ferroso

## **B03B VITAMINA B<sub>12</sub> Y ÁCIDO FÓLICO**

B03BA01 Cianocobalamina (vitamina B12)

B03BB01 Ácido fólico

## **C APARATO CARDIOVASCULAR**

### **C01 TERAPIA CARDIACA**

#### **C01A GLUCÓSIDOS CARDIOTÓNICOS**

C01AA05 Digoxina

#### **C01B ANTIARRÍTMICOS (CLASES I Y III)**

C01BA01 Quinidina

C01BB02 Mexiletina

C01BC03 Propafenona

C01BC04 Flecainida

C01BD01 Amiodarona

#### **C01D VASODILADORES UTILIZADOS EN ENFERMEDADES CARDIACAS**

C01DA08 Dinitrato de isosorbide

C01DA14 Mononitrato de isosorbide

### **C02 ANTIHIPERTENSIVOS PUROS**

#### **C02A ANTIADRENÉRGICOS CENTRALES**

C02AB Metildopa

#### **C02C ANTIADRENÉRGICOS DE ACCIÓN PERIFÉRICA**

C02CA01 Prazosin

### **C03 DIURÉTICOS**

C03AA03 Hidroclorotiazida

C03BA04 Clortalidona

C03BA11 Indapamida

C03CA01 Furosemida

C03DA01 Espironolactona

C03EA Hidroclorotiazida + amiloride

### **C07 BLOQUEANTES BETADRENÉRGICOS**

C07AA Bloqueantes betadrenérgicos no cardioselectivos, solos

C07AA05 Propranolol

C07AB Bloqueantes betadrenérgicos cardioselectivos, solos

C07AB03 Atenolol

C07AG Bloqueantes alfa/betadrenérgicos

C07AG02 Carvedilol

- Pacientes con insuficiencia cardíaca con disfunción sistólica documentada mediante ecocardiograma con fracción de eyección < 45 %
- Hipertensión Arterial en situaciones puntuales tales como:
- Pacientes con indicación de bloqueo betaadrenérgico que no puedan recibir bloqueantes beta puros .

## **C08 BLOQUEANTES DE CANALES DE CALCIO**

### **C08CA Derivados de dihidropiridina**

C08CA01 Amlodipina

- Pacientes ancianos con hipertensión sistólica e intolerancia demostrada a diuréticos tiazídicos
- Pacientes con hipertensión refractaria a betabloqueantes, diuréticos e IECA y en quienes es necesario añadir un vasodilatador

C08DA Derivados de fenilalquilamina

C08DA01 Verapamilo

### **C08DB Derivados de benzotiazepina**

C08DB01 Diltiazem

## **C09 FÁRMACOS ACTIVOS SOBRE EL SISTEMA RENINA-ANGIOTENSINA**

### **C09AA Inhibidores de la Enzima Convertidora de Angiotensina**

C09AA02 Enalapril

- Pacientes con hipertensión arterial y nefropatía diabética en cualquiera de sus estadios
- Pacientes con hipertensión arterial y glomerulopatías de cualquier origen
- Pacientes con hipertensión arterial e insuficiencia cardíaca con disfunción sistólica documentada
- Pacientes con reducción de la fracción de eyección post infarto agudo de miocardio

### **C09C Antagonistas de Angiotensina II**

C09CA01 losartán

Pacientes con indicación de recibir un inhibidor de la ECA y que presenten intolerancia al mismo

## **C10 HIPOLIPEMIANTE**

### **C10AA Inhibidores de HMG CoA reductasa**

C10AA01 Simvastatina

Pacientes con indicación de recibir tratamiento hipolipemiante con estatinas de acuerdo al Panel de Tratamiento de Adultos III del Programa Nacional de Educación en Colesterol de los Estados Unidos (NCEP ATP III)

**C10AB Fibratos**

C10AB02 Bezafibrato

Pacientes con indicación de recibir tratamiento hipolipemiante con bezafibrato de acuerdo al Panel de Tratamiento de Adultos III del Programa Nacional de Educación en Colesterol de los Estados Unidos (NCEP ATP III)

C10AB04 Gemfibrozilo

Pacientes con indicación de recibir tratamiento hipolipemiante con gemfibrozilo de acuerdo al Panel de Tratamiento de Adultos III del Programa Nacional de Educación en Colesterol de los Estados Unidos (NCEP ATP III)

**C10AC Secuestrantes de sales biliares**

C10AC01 Colestiramina

Pacientes con indicación de recibir tratamiento hipolipemiante con colestiramina de acuerdo al Panel de Tratamiento de Adultos III del Programa Nacional de Educación en Colesterol de los Estados Unidos (NCEP ATP III)

**D TERAPIA DERMATOLÓGICA****D01A ANTIFÚNGICOS TÓPICOS**

D01AA01 Nistatina

D01AC ketoconazol

**D01B ANTIFÚNGICOS SISTÉMICOS**

D01BA02 Terbinafina ORAL

- Pacientes con onicomicosis grave producida por dermatofitos.

**D05A ANTIPSORIÁSICOS TÓPICOS**

D05AX02 Calcipotriol

- Pacientes con psoriasis en placas que no reciben tratamiento sistémico.

**D05B ANTIPSORIÁSICOS SISTÉMICOS**

D05BB02 Acitretina

- Pacientes con psoriasis severa
- Pacientes con trastornos hereditarios de queratinización (síndrome de Papillon Lefevre, enfermedad de Darier)

**D06 ANTIINFECCIOSOS TÓPICOS**

D06A gentamicina

D06AX mupirocina

**D07 CORTICOSTEROIDES TÓPICOS**

D07AA02 Hidrocortisona

D07AB01 Clobetasol

D07AB09 Triamcinolona

D07AC01 Betametasona

### **D10A ANTIACNÉICOS TÓPICOS**

D10AE51 peróxido de benzoílo

D10AF02 Eritromicina tópica

D10AF02 Clindamicina tópica

### **D10B ANTIACNÉICOS SISTÉMICOS**

D10BA01 Isotretinoína

Pacientes con acné nódulo quístico o acné conglobata

## **G TERAPIA GENITOURINARIA (INCL. HORMONAS SEXUALES)**

### **G01 ANTIINFECCIOSOS Y ANTISÉPTICOS TOPICOS GINECOLÓGICOS**

G01AA01 Nistatina

G01AF01 Metronidazol

### **G02A OXITÓCICOS**

G02CA Simpaticomiméticos inhibidores del parto

G02CA Ritodrina

G02CA Isoxsuprina

- Indicado para la inhibición de parto prematuro en gestaciones no complicadas de entre 24 y 33 semanas de edad gestacional
- La necesidad terapia prolongada con drogas uteroinhedoras más allá de las 48 horas necesarias para la maduración pulmonar debe ser evaluada cuidadosamente, y a priori evitada, ya que incrementaría el riesgo materno sin otorgar beneficio clínico alguno respecto a mortalidad perinatal

### **G03 HORMONAS SEXUALES Y MODULADORES GENITALES**

#### **G03C ESTRÓGENOS**

Se excluyen de la cobertura los preparados anticonceptivos

G03C01 Etinilestradiol

G03C02 Estradiol

G03C04 Estriol

G03C57 Estrógenos conjugados

#### **G03D PROGESTÁGENOS**

G03DA02 Medroxiprogesterona

G03DA04 Progesterona

#### **G03FA Combinaciones fijas de estrógenos con progestágenos**

Se excluyen de la cobertura los preparados anticonceptivos

G03FA01 Norestisterona y estrógeno  
G03AA07 Levonorgestrel y estrógeno

### **G03G GONADOTROFINAS Y OTROS ESTIMULANTES DE LA OVULACIÓN**

G03GA01 Gonadotrofina coriónica humana

- Pacientes con criptorquidia en quienes no exista un obstáculo anatómico para el descenso testicular
- Pacientes de sexo masculino con hipogonadismo hipogonadotrófico

### **G03X OTRAS HORMONAS SEXUALES Y MODULADORES GENITALES**

G03XA01 Danazol

Pacientes con anemia hemolítica autoinmune que no responde a glucocorticoides en dosis apropiadas (equivalente a 40 a 60 mg/m<sup>2</sup> día de metilprednisona), esplenectomía e inmunosupresores.

Se debe requerir historia clínica donde consten los tratamientos instituidos (dosis y respuesta obtenida), el estudio hematológico del paciente (índice reticulocítico, reacción de Coombs) y ecografía de abdomen.

Pacientes con púrpura trombocitopénica idiopática que no responde a glucocorticoides en dosis apropiadas (equivalente a 1,5 a 2 mg/kg de metilprednisona) y esplenectomía..

Pacientes con endometriosis pelviana dolorosa que no responde a asociaciones estrógenos-gestágenos en dosis apropiadas o medroxiprogesterona 10 a 30 mg/día

Se debe requerir historia clínica donde conste sintomatología, documentación histopatológica del diagnóstico de endometriosis y el objetivo terapéutico de la prescripción (quedando expresamente excluido de cobertura el tratamiento de la infertilidad)

### **PREPARADOS UROLÓGICOS**

#### **G04A ANTISÉPTICOS Y ANTIINFECCIOSOS URINARIOS**

G04AC01 Nitrofurantoína

#### **G04BD Antiespasmódicos urinarios**

G04BD04 Oxibutinina

Pacientes con incontinencia de orina tipo urgencia miccional determinada clínicament

#### **G04C FARMACOS UTILIZADOS EN HIPERTROFIA PROSTATICA BENIGNA**

G04CA03 Bloqueante alfa adrenérgico con acción selectiva sobre tracto urinario: terazosina  
Pacientes con hipertrofia benigna de próstata + sintomatología de obstrucción mayor a 7 puntos IPSS, que NO reciban finasteride

G04CB01 Finasteride

Pacientes con hipertrofia benigna de próstata + sintomatología de obstrucción mayor a 7 puntos IPSS, que NO reciban bloqueantes alfa.



## **H TERAPIA HORMONAL**

### **H01B HORMONAS DEL LOBULO POSTERIOR DE LA HIPOFISIS**

H01BA02 Desmopresina

Pacientes con diabetes insípida de origen hipofisario

Se debe requerir historia clínica donde conste como se arribó al diagnóstico y los estudios de imágenes solicitados

### **H02 CORTICOSTEROIDES SISTEMICOS**

#### **H02AB Glucocorticoides**

H02AB09 Hidrocortisona

H02AB01 Betametasona

H02AB02 Dexametasona

H02AB04 Metilprednisolona

H02AB07 Prednisona

### **H03 TERAPIA TIROIDEA**

H03AA01 Levotiroxina sódica

H03BB01 Metimazol

## **J TERAPIA ANTIINFECCIOSA, USO SISTEMICO**

### **J01 ANTIBACTERIANOS**

#### **J01A TETRACICLINAS**

J01AA02 Doxiciclina

#### **J01C BETA-LACTAMICOS, PENICILINAS**

J01CA04 Amoxicilina

J01CE02 Fenoximetilpenicilina

J01CE08 Penicilina benzatínica

J01CR Amoxicilina + clavulanato:

Tratamiento empírico de pacientes con mordeduras animales o humanas, reactivación de EPOC en pacientes refractarios a drogas de menor costo, tratamiento ambulatorio de enfermedad inflamatoria pelviana, orquiepididimitis aguda, sinusitis aguda secundaria a infección odontogénica, o en presencia de episodios recidivantes documentados el mismo año, otitis media aguda con falta de respuesta a aminopenicilina luego de 72 horas o en pacientes inmunodeprimidos, pie diabético con infección severa.

#### **J01D CEFALOSPORINAS**

J01DA01 Cefalexina

J01DA06 Cefuroxima

J01DA11 Ceftazidima

- Pacientes con infecciones por Pseudomonas aeruginosa de tratamiento ambulatorio para quienes no exista una droga alternativa vía oral

J01DA13 Ceftriaxona

- Pacientes con infecciones gonocócicas de cuello uterino, recto o uretra documentadas a través de examen directo con técnica de Gram
- Pacientes con neumonía extrahospitalaria de mediano o alto riesgo, cuando se decida un manejo domiciliario controlado como opción a la internación

## **J01E SULFAMIDAS Y TRIMETOPRIMA**

J01EE01 Sulfametoxazol y trimetoprima

## **J01F MACROLIDOS, LINCOSAMIDAS Y ESTREPTOGRAMINAS**

J01FA01 Eritromicina

J01FA02 Espiramicina

J01FA09 Claritromicina

- Pacientes con diagnóstico clínico y radiológico de neumonitis
- Pacientes con diagnóstico de neumonía de la comunidad e indicación de un macrólido que posean antecedentes documentados de intolerancia a eritromicina

J01FF01 Clindamicina

Pacientes con infecciones por gérmenes anaerobios en manejo ambulatorio (para completar tratamiento luego del alta) tales como pie diabético con infección profunda , neumonía por gérmenes anaerobios y absceso de pulmón.

## **J01G AMINOGLUCOSIDOS**

J01GB03 Gentamicina.

Infecciones por gérmenes Gram negativos de manejo ambulatorio que por la situación clínica y análisis bacteriológico no ofrezcan otras alternativas de manejo .

## **J01M QUINOLONAS ANTIBACTERIANAS**

J01MA02 Ciprofloxacina

J01MA06 Norfloxacina

J01XD Imidazoles

J01XD01 Metronidazol

## **J02 ANTIMICOTICOS, USO SISTEMICO**

J02AC0 Fluconazol

## **J06B INMUNOGLOBULINAS**

J06BA01 Inmunoglobulinas humanas normales para administración intramuscular

Profilaxis postexposición a hepatitis A dentro de las dos semanas de producido el contacto  
Profilaxis postexposición precoz a sarampión en niños y adultos inmunocomprometidos en quienes no existan títulos adecuados de anticuerpos circulantes

J06BB01 Inmunoglobulina anti-D (Rh).

- Profilaxis en embarazadas Rh negativas posterior a episodios de riesgo de sensibilización materna (aborto, nacimiento)..
- Profilaxis en embarazadas Rh negativas anterior al momento del nacimiento: .

J06BB04 Inmunoglobulina antihepatitis B.

- Profilaxis de transmisión vertical en recién nacidos de madres portadoras crónicas de virus de hepatitis B
- Profilaxis postexposición a virus de hepatitis B por inoculación transdérmica o mucosa, dentro de los 2 días del contacto.

J06BB02 Inmunoglobulina antitetánica

J07AM03 Toxoide tetánico combinado con inmunoglobulina antitetánica

## **M APARATO LOCOMOTOR**

### **M01A ANTIINFLAMATORIOS NO ESTEROIDES DE USO SISTEMICO**

M01AB05 Diclofenac

M01AE01 Ibuprofeno

### **M01AH INHIBIDORES SELECTIVOS DE CICLOOXIGENASA 2**

#### **M01AH01 Celecoxib**

- Pacientes con artritis reumatoidea u osteoartritis, con historia de úlcera gastroduodenal, perforación o sangrado gastrointestinal.
- Pacientes con alto riesgo de desarrollar efectos adversos gastrointestinales severos: mayores de 65 años, quienes toman otros medicamentos que aumentan el riesgo de efectos adversos gastrointestinales, quienes reciben tratamiento crónico con dosis máximas de antiinflamatorios no esteroides.

### **M01C ANTIRREUMATICOS ESPECIFICOS**

M01CB02 Aurotisulfato de sodio

M01CC01 Penicilamina

L01BA01 Metotrexato

### **M04 ANTIGOTOSOS**

M04AA01 Allopurinol

M04AC01 Colchicina

### **M05B FARMACOS QUE AFECTAN A LA MINERALIZACION OSEA**

M05BA04 Alendronato

- Pacientes con osteoporosis postmenopáusicas establecidas, de acuerdo a los criterios de la Organización Mundial de la Salud
- Pacientes con enfermedad de Paget ósea
- Prevención y tratamiento de la osteoporosis producida por glucocorticoides

## **N SISTEMA NERVIOSO**

### **N02A ANALGESICOS OPIOIDES**

N02AA01 Morfina

Tratamiento de dolor de origen neoplásico, de acuerdo a recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud

N02AA59 Codeína, en combinación con paracetamol o ibuprofeno

- Tratamiento de dolor de origen neoplásico, de acuerdo a recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud
- Tratamiento de dolor postquirúrgico

### **N02B OTROS ANALGESICOS Y ANTIPIRETTICOS**

N02BE01 Paracetamol

### **N02C ANTIMIGRAÑOSOS**

N02CC sumatriptán,

Tratamiento agudo de la migraña y cefalea en racimos en pacientes refractarios a drogas convencionales

### **N03A ANTIEPILEPTICOS**

N03AA02 Fenobarbital

N03AB02 Fenitoína

N03AD01 Etosuximida

N03AE01 Clonazepam

- Pacientes con epilepsia mioclónica, ausencias atípicas, convulsiones tónicas y atónicas
- Tratamiento adyuvante para epilepsias parciales con o sin generalización secundaria que no sean satisfactoriamente controladas con otros antiepilépticos

N03AF01 Carbamacepina

N03AG01 Valproato

N03AG04 Vigabatrin

- Tratamiento adyuvante en epilepsias parciales refractarias a drogas de uso convencional (fenitoína, etosuximida, carbamacepina, valproato y clonazepam)

N03AF02 Oxcarbacepina

- Pacientes con síntomas documentados de intolerancia a carbamacepina tales como ataxia, diplopia o visión borrosa.
- Pacientes con efectos adversos hematológicos a carbamacepina documentados
- Pacientes con antecedentes de hipersensibilidad documentados a carbamacepina tales como rash, eosinofilia o esplenomegalia.
- Alternativa a carbamacepina en tratamientos antiepilépticos combinados cuando se alcanzan dosis máximas de fenobarbital, fenitoina o valproato

#### N03AX09 Lamotrigina

- Pacientes con epilepsia parcial multiresistente
- Pacientes con epilepsia parcial secundariamente generalizada multiresistente
- Pacientes con convulsiones tonicoclónicas multiresistentes
- Tratamiento adyuvante en síndrome de Lennox Gastaut

#### N03AX12 Gabapentin

- Tratamiento adyuvante para epilepsias parciales con o sin generalización secundaria que no sean satisfactoriamente controladas con otros antiepilépticos
- Pacientes con dolor neuropático resistente a antidepresivos tricíclicos

### N04 ANTIPARKINSONIANOS

N04AA01 Trihexifenidilo

N04AA02 Biperideno

N04BA02 Levodopa + inhibidor de decarboxilasa (levodopa + carbidopa, levodopa + benzerasida)

N04BB01 Amantadina

N04BC01 Bromocriptina

N04BC02 Pergolida

- Pacientes con enfermedad de Parkinson con indicación de tratamiento agonista dopaminérgico y agotamiento de la respuesta a bromocriptina
- Pacientes con enfermedad de Parkinson con indicación de tratamiento agonista dopaminérgico y fluctuaciones de la respuesta a bromocriptina

#### N04BC04 Ropinirol

- Terapia adyuvante en pacientes con enfermedad de Parkinson con fluctuaciones en la respuesta a levodopa + inhibidor de decarboxilasa y falta de respuesta a bromocriptina y pergolide.
- Terapia adyuvante en pacientes con enfermedad de Parkinson e intolerancia manifiesta a agonistas dopaminérgicos derivados del ergot (edema, fibrosis retroperitoneal, eritromelalgia o reacciones cutáneas)
- Puede ser indicado como monoterapia en pacientes jóvenes en quienes el tratamiento prolongado con levodopa + inhibidor de decarboxilasa se asocia a un elevado riesgo de diskinesia invalidante

#### N04BC05 Pramipexol

- Terapia adyuvante en pacientes con enfermedad de Parkinson con fluctuaciones en la respuesta a levodopa + inhibidor de decarboxilasa y falta de respuesta a bromocriptina y pergolide.

- Terapia adyuvante en pacientes con enfermedad de Parkinson e intolerancia manifiesta a agonistas dopaminérgicos derivados del ergot (edema, fibrosis retroperitoneal, eritromelalgia o reacciones cutáneas)

N02CA07 Lisurida

- Pacientes con enfermedad de Parkinson con indicación de tratamiento agonista dopaminérgico y agotamiento de la respuesta a bromocriptina
- Pacientes con enfermedad de Parkinson con indicación de tratamiento agonista dopaminérgico y fluctuaciones de la respuesta a bromocriptina

N04BX02 Entacapone

Terapia adyuvante en pacientes con enfermedad de Parkinson que reciben levodopa + inhibidor de decarboxilasa presentando fluctuaciones en la respuesta (específicamente, deterioro de final de dosis)

## **N05A ANTIPSICOTICOS**

N05AA01 Clorpromazina

N05AA02 Levomepromazina

N05AB06 Trifluoperazina

N05AC02 Tioridazina

N05AD01 Haloperidol

N05AH02 Clozapina

- Pacientes con diagnóstico de esquizofrenia en sus distintas formas clínicas no controlados con antipsicóticos típicos
- Tratamiento adyuvante sumado a litio en pacientes con trastorno bipolar
- Pacientes en tratamiento con antipsicóticos típicos que presenten síntomas extrapiramidales no controlados y/o disquinesias tardías
- Pacientes con síntomas negativos que no responden a antipsicóticos típicos

N05AH03 Olanzapina

- Pacientes con esquizofrenia, trastorno bipolar o trastorno depresivo mayor con síntomas psicóticos que hayan padecido agranulocitosis o leucopenia documentada atribuible a clozapina o fenotiazinas
- Pacientes con antecedentes de discrasias sanguíneas documentadas que no responden a antipsicóticos típicos o risperidona.

N05AN Litio

N05AX08 Risperidona

Pacientes en tratamiento con antipsicóticos típicos que presenten síntomas extrapiramidales no controlados y/o disquinesias tardías

Pacientes con síntomas negativos que no responden a antipsicóticos típicos

## **N05B ANSIOLITICOS**

N05BA01 Diazepam

- Tratamiento sintomático a corto plazo (2 a 4 semanas) de la ansiedad severa, tanto cuando ésta ocurre como un síntoma aislado, cuando se presenta acompañada de insomnio o en el contexto cuadros transitorios complejos (enfermedad psicósomática, orgánica o psicótica).
- Tratamiento inmediato de cuadros convulsivos de origen diverso
- Tratamiento de espasticidad y espasmos musculares de origen diverso
- Tratamiento adyuvante en etapa de deprivación de diversas drogadependencias

N05BA06 Lorazepam

- Tratamiento sintomático a corto plazo (2 a 4 semanas) de la ansiedad severa, tanto cuando ésta ocurre como un síntoma aislado, cuando se presenta acompañada de insomnio o en el contexto cuadros transitorios complejos (enfermedad psicósomática, orgánica o psicótica).
- Tratamiento inmediato de cuadros convulsivos de origen diverso

## **N05C HIPNOTICOS Y SEDANTES**

N05C Flunitrazepam

## **N06A ANTIDEPRESIVOS**

### **N06AA Inhibidores no selectivos de la recaptación de monoaminas**

N06AA02 Imipramina  
 N06AA04 Clomipramina  
 N06AA09 Amitriptilina  
 N06AA10 Nortriptilina

### **N06AB Inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina**

N06AB03 Fluoxetina  
 N06AF Inhibidores no selectivos de la MAO  
 N06AF04 Tranilcipromina

### **N06AX Otros antidepresivos**

Dada que no existe mayor efectividad comprobada para ninguna de las siguientes drogas sobre el resto se sugiere la obligación de cobertura de al menos una de las siguientes drogas.

N06AX06 Nefazodone

Tratamiento de pacientes con diagnóstico de enfermedad depresiva que no han respondido a drogas de primera línea

N06AX16 Venlafaxina

Tratamiento de pacientes con diagnóstico de enfermedad depresiva grave o desorden de ansiedad generalizada que no han respondido a drogas de primera línea

## **N06B PSICOESTIMULANTES**

N06BA04 Metilfenidato

Cobertura dentro de programa de tratamiento integral del síndrome de hiperactividad con déficit de atención, a cargo de un médico especialista.

## **N07 OTROS FARMACOS PARA EL SISTEMA NERVIOSO**

N07AA01 Neostigmina  
N07AA02 Piridostigmina

## **N07C ANTIVERTIGINOSOS**

N07CA10 Dimenhidrinato

## **P ANTIPARASITARIOS**

### **P01 ANTIPROTOZOARIOS**

P01AB01 Metronidazol  
P01BA01 Cloroquina  
P01BA02 Hidroxicloroquina  
P01BD51 Pirimetamina y combinaciones con sulfadiazina

### **P02 ANTIHELMINTICOS**

P02CA01 Mebendazol  
P02DA01 Niclosamida

## **R APARATO RESPIRATORIO**

### **R01 PREPARADOS NASALES**

R01AA07 Xilometazolina  
R01AD Mometasona

### **R03 ANTIASMATICOS**

#### **R03A ADRENERGICOS, EN INHALACION**

R03AC02 Salbutamol  
R03AC Salmeterol

Tratamiento adyuvante en pacientes que reciben glucocorticoides inhalatorios para mejorar control de síntomas de asma nocturna

#### **R03B OTROS ANTIASMATICOS, EN INHALACION**

R03BA Budesonide  
R03BB01 Bromuro de Ipratropio



R03BC01 Cromoglicato disódico

R03BC01 Montelukast

- Sólo se extiende su cobertura a aquellos pacientes que no hubieran respondido al tratamiento en forma profiláctica con Cromoglicato Disódico.

### **R03D OTROS ANTIASMATICOS, USO SISTEMICO**

R03DA04 Teofilina

### **R06 ANTIHISTAMINICOS SISTEMICOS**

R06AA02 Difenhidramina

R06AX13 Loratadina

## **S ORGANOS DE LOS SENTIDOS**

### **S01 OFTALMOLOGICOS**

#### **S01A ANTIINFECCIOSOS LOCALES**

S01AA Un antibacteriano local de bajo costo en forma líquida y semisólida (cloranfenicol, eritromicina)

S01AA Un antibacteriano local de alto costo en forma líquida y semisólida (tobramicina, ciprofloxacina)

S01AD03 Aciclovir en forma líquida y semisólida

#### **S01B ANTIINFLAMATORIOS**

S01BA01 Un glucocorticoide de aplicación local oftalmológica (dexametasona, prednisolona)

S01BC03 Un antiinflamatorio no esteroide de aplicación local oftalmológica (flurbiprofeno, diclofenac, ketorolac)

S01C Combinaciones de glucocorticoides y antiinfecciosos de uso local ocular

#### **S01E ANTIGLAUCOMA Y MIOTICOS**

S01EB01 Pilocarpina

S01EC01 Acetazolamida

S01EC03 Un inhibidor de anhidrasa carbónica de aplicación local oftalmológica: dorzolamida

S01ED01 Timolol

#### **S01F MIDRIATICOS Y CICLOPLEJICOS**

S01FA04 Ciclopentolato

S01FA06 Tropicamida